

2017 年执业药师考试《药学综合知识与技能》真题及答案

一、最佳选择题(共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。)

1.药师在审核处方时,无需要求确认或重新开处方的情形是(B)

A.诊断为麻疹,使用阿莫西林抗感染治疗

B.将酚麻美敏胶囊和板蓝根颗粒开在同一张处方上

D.头孢曲松钠选用复方氯化钠注射液作溶媒

C.给糖尿病患者同时开具消渴和格列本脲

E.低分子肝素的给药方法为静脉滴注

2.患者到药店购买鱼肝油,药师应给予(D)

A.鱼油

B.维生素 A

C.维生素 D

D.维生素 AD

E.维生素 E

3.双歧三联活菌制剂说明书标明“冷处”贮存,其贮存条件是指(E)

A.温度不超过 20℃

B.温度 10℃~30℃

C.温度不超过 20℃且遮光

D.温度不超过-5℃且避光



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

E.温度在 2°C ~ 10°C 之间

4.因可提高血液携氧量,被长跑运动员用于提高成绩,因而被列为米在剂管理的药物是(D)

A.甲睾酮

B.可卡因

C.哌替啶

D.人促红素

E.麻黄碱

5.万古霉素 0.5g 加入 5%葡萄糖注射液 100ml 中静脉滴注要求注时间不得少巴知每毫升 15

滴每分钟最多可滴注的滴数约是(C)

A.7 滴

B.15 滴

C.25 滴

D.50 滴

E.60 滴

6.急性胰腺炎伴脂质代谢紊乱的患者不宜静脉滴的药物是(E)

A.胰岛素注射液

B.生长抑素注射液

C.葡萄糖注射液

D.乌司他丁注射液



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

E.脂肪乳注射液

7.下列药物中适宜在睡前服用的是(D)

A.泼品松

B.美洛昔康

C.多潘立酮

D.辛伐他汀

E.奥利司他

8.癫痫持续状态首选的治疗方案是(B)

A.口服丙戊酸钠 200mg

B.静脉注射地西泮 10mg

C.静脉注射丙戊酸钠 200mg

D.口服地西泮 10mg

E.肌内注射地西泮 10mg

9.下列关于巨幼细胞性贫血的说法错误的是(C)

A.老年人和酗酒者为高危人群

B.恶性贫血者需要终生维持治疗

C.可静脉滴注维生素 B₁₂100~500μg

D.全胃切除的巨幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗

E.在不能确定只是单纯叶酸缺乏引起的贫血时,叶酸应联合维生素 B₁₂ 治疗



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

10. 会干扰乙醇代谢过程导致双硫仑样反应, 用药期间不宜饮酒的药物是(D)

A. 对乙酰氨基酚

B. 阿奇霉素。

C. 阿司匹林药

D. 甲硝唑

E. 伊曲康唑

11. 患毒, 27 岁, 妊娠 20 周, 出现发热体温最高达 38.5°C, 体格检查: 肾区叩痛, 经相关实验室检查

诊断为急性肾盂肾炎, 宜选用的药物是(B)

A. 甲硝唑

B. 头孢噻肟钠

C. 阿米星

D. 阿奇霉素

E. 诺氟沙星

12. 容易通过被动扩散透过胎盘屏障的物特点是(C)

A. 分子量大、弱碱性

B. 弱酸性蛋白结合率低、半衰期长

C. 脂溶、分子量小

D. 蛋白结合率高, 具有手性、分布容积大

E. 蛋白结合率高、分子量大



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

13. 下列关于癌嘴患者的镇痛药使用原哪误的是(E)

- A. 按患者疼痛程度分阶梯给药
- B. 按时给药而不是按需给药
- C. 提倡无创的给药方式
- D. 用药须个体化
- E. 疼痛时用药, 不疼痛时不用药

14. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法, 错误的是(A)

- A. 抗抑郁药起效较快, 使用 1 周后可判疗效
- B. 应尽可能单一用药, 足量、足疗程治疗
- C. 剂量递增尽可能采用最小有效剂量使不良反应减至最小
- D. 当单药治疗无效时可考虑联合使用两种作用想制不同的抗抑郁药
- E. SSRI 类抗抑郁药不宜与单胺氧化酶抑制剂联合使用

15. 根据《中国成人超重和肥胖预防控制指南》体重指数(BMI)判断为肥胖的标准是(B)

- A. $BMI \leq 18.5$
- B. $BMI \geq 28.0$
- C. $BMI < 21.5$
- D. $BMI \geq 24.0$
- E. $BMI \geq 25.0$

16. 患者果 57 岁, 因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊行病学调查及相关实验至检查诊



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

断为博江甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是(C)

- A.金刚烷胺
- C.奥司他韦 A 数瘟
- B.金刚乙胺
- D.利巴韦林
- E.阿昔洛韦

17.下列峡子烫伤救治措施的说送正确的是(B)

- A.创面及时外涂甲紫溶液预防感染
- B.度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏
- C.可用清洁塑料薄膜覆盖创面,以防创面感染
- D.烫伤患者的镇哭镇静药物首选氨丙嗪
- E.失水较多的熊者应多饮白开水或无盐饮料

18.患者,男,80 岁,因发热、咳嗽、咳痰 2 天就诊诊断为社区获得性肺炎,给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素 C 等治家患者用药 3 天后出现失振、烦躁不安等症状最可能引起该症状的药物是(D)

- A.甘草合剂
- B.氨溴索
- C.对乙酰氨基酚
- D.左氧蒲沙星



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

E.维生素 C

9.药师在指导痲南理用药时应同时关注物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是(B)

A.左甲状腺素与钙剂同服

B.硫酸亚与维生素 C 同服

C.华淞写人参同服时与牛奶同服

D.异烟肼与牛奶同服

E.利福平与脂肪餐同服

20.下列关于甲获腺功能亢进症患者教旁的说法错误的是(C)

A.禁食富含碘的食物

B.避免使用含碘药物

C.妊娠伴年状腺功能亢进症患者音选甲疏咪唑圆

D.避免饮用咖啡等兴奋性饮料

E.给予充足的热量、蛋白质和维生素

21.患者女 24*周前曾有同事患有沙眼系衣原体感染后发现自己出现眼红、眼痒等不遭洙药店购药,药师可推荐的药物是(C)

A.色甘酸钠滴眼液

B.玻璃酸钠滴眼液

C.酞丁安滴眼液



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.毛果芸香碱滴眼液

E.吡诺克辛滴眼液

22.良性前列腺增生症老年患者应用 α_1 肾上腺素能受体阻断剂治疗时可能导致的不良反应是

(A)

A.体位性低血压

B.尿潴留

C.干咳

D.乳腺增生

E.前列腺特异性抗原(PSA)水平升高

23.可使高血压患者血压升高的药物是(C)

A.速感宁胶囊

B.银翘解毒片

C.复方酚咖伪麻胶囊

D.抗感宁胶囊

E.复方田七胃痛胶囊

24.治疗癌痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘,宜选择的药物是(B)

A.比沙可啶

B.乳果糖

C.硫酸镁



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.东莨菪碱

E.阿托品

25.下列药物使用方式,正确的是(D)

A.酵母片在餐后整片用水送服

B.硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰送服

C.氧氟沙星滴眼液打开使用后,继续使用 3 个月

D.乙酰半胱氨酸泡腾片用 100ml 温开水浸泡溶解后服用

E.红霉素软膏涂敷于眼睑内,每晚睡前一次

26.痛风缓解期宜选用的治疗药物是(A)

A.苯溴马隆

B.阿司匹林

C.秋水仙碱。

D.泼尼松

E.双氯芬酸钠

27.短效口服避孕药的主要成分成分是(E)

A.孕激素+雄激素

B.雌激素

D.雌激素+雄激素+糖皮质激素

C.孕激素



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

E.雌激素+孕激素

28.患者男 59 岁哮喘病史 8 年近日因急性脑梗死就诊住院海疗 2 周后出院。对于该患者脑血管病的二级预防,宜选用的抗血小板药物是(B)

A.氯吡格雷

B.阿司匹林

C.对乙酰氨基酚

D.华法林

E.依诺肝素

29.便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是(D)

A.硫酸镁

B.聚乙二醇 4000

C.乳果糖

D.番泻叶

E.沙可呢西药

30.患者男,70 岁,典型的“面具脸”“慌张步态”表现,临床诊断为帕金森病患者同时患有前列腺增生不宜选用的药物是(B)

A.普拉克索

B.苯海索

C.卡比多田



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

D.甲基雾

E.金刚烷胺

31.药师在工作中防用药错误可以采取的行为不包括(D)

A.严格审核处方

B.仔细核对药品

C.进行用药指导

D.自行修改错误处方

E.规范操作流程

32.下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法,错误的是(D)

A.口服后 30 分钟内应保持立位或坐便

B.应避免同时使用两种双膦酸盐

C.随餐服用,并大量饮水,可增加吸收、减少胃肠道刺激

D.食管炎为典型不良反应

E.已批准用于提早绝经女性骨质疏松的防治

33.患者女 45 岁,既往有心律失常(Q-T 间期延长)、低钾血症近日因发热、咳嗽、咳痰就诊,诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是(A)

A.莫西沙星

B.头孢呋辛酯

C.氨溴索



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

D.阿莫西林

E.对乙酰氨基酚

34.下列于服用阿昔洛韦治疗带状疱疹的说法，错误的是(E)

A.应尽早使用阿昔洛韦

B.除口服外,可局部使用阿昔洛韦软膏

C.口服给药,每日给药 5 次

D.治疗疗程般 7~10 天

E.阿昔洛韦主要经肝脏代谢，肾功能不全患者不需减量使用

35.患者,77 岁,因感冒入熟咳嗽,自服酚麻美敏片、维 C 银翘片,三天后出现急性尿潴留。可引起该患者出现尿潴留的药物成分是(D)

A.对乙酰氨基酚

B.维生素 Ce

C.银翘 6

D.氯苯那敏

E.右美沙芬

36.目前推荐的绝经期激素补充治疗的窗口期是(A)

A.绝经后 10 年之内或 60 岁以前

B.大于 60 岁

C.绝经后 5 年之内



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.绝经后 5 年之内或大于 60 家

E.绝经后 20 年之内

37.细菌性尿路感染最常见的致病菌是(D)

A.肠球菌

B.铜绿假单胞菌

C.克雷伯杆菌

D.大肠埃霉菌

E.葡萄球菌

38.下列关于失眠药物治疗策略的说法,正确的是(B)

A.原发性失眠在非药物治疗无效时首选苯一氮草类抗失眠药

B.失眠继发于或伴发于其他疾病时,应同时治疗原发或伴发疾病

C.药物治疗开始后应及时开展血药浓度监测

D.焦虑症患者存在失眠时协失眠药物为主

E.对于长期应用镇静催眠药物的慢性失眠患者,提倡药物连续治疗

39.说明书中没每船童用药剂量时,可以根据 J 儿科用药换算方法进行计算。下列计算方法/

错误的是 (A)

A.小儿药物剂量=(年龄×成人剂量)/小儿体表面积(m²)

B. Fried 公式,婴儿药物剂量=月龄×成人剂量/150

C.儿童剂量=成人剂量×儿童体表面积(m²)/1.73(m²)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

D. 儿童剂量 = 成人剂量 × 小儿体重(kg)/70

E. Young 公式, 小儿药物剂量 = (年龄 × 成人剂量)/(年龄 + 12)

40. 患者男, 65 岁, 身高 170cm, 体重 60Kg 经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测(肌酐清除率 45ml/min), 诊断为 2 型糖尿病、肾功能不全, 该患者应首选的药物是(C)

A. 格列本脲

B. 格列齐特

C. 格列喹

D. 格列糖

E. 格列美脲

二、配伍选择题(共 50 题, 每题 1 分。题目分为若干组, 每组题目对应同一组备选项, 备选项可重复选用, 也可不选用。每题只有 1 个备选项最符合题意。)

【41-43】

A. C 级

B. D 级

C. A 级

D. X 级

E. B 级

根据药物对胎儿 L 的危害, 美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

41.正常剂量维生素 D 的妊娠毒性分级是(C)

42.头孢曲松的妊娠毒性分级是(E)

43.依那普利的妊娠毒性分级是(B)

【44-45】

A.血红蛋白减少

B.嗜酸性粒细胞增

C.中性粒细胞增多

D.红细胞增多

E.血小板增多

44.缺铁性贫血患者常表现为(A)

45.过敏性皮炎常表现为(B)

46.急性细菌性扁桃体炎患者常表现为(C)

【47-49】

A.维 A 酸片

B.左旋多巴片

C.地衣芽孢杆菌活菌胶囊

D.非洛地平片

E.去氨加压素理级瘟

47.高蛋白饮食在肠内产生氨基酸会影响其吸收、降低疗效的药物是(B)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

48.与葡萄柚汁同服可能升高血药浓度的药物是(B)

49.高脂饮食可促进其吸收的药物是(A)

【50-51】

A.阿昔洛韦软膏

B.维 A 酸乳

C.氢化可的松软膏

D.复方苯甲酸酊

E.炉甘石洗剂

50.治疗水疱型脚癣宜选用(D)

51.治疗中毒痤疮宜选用(B)

【52-54】

A.双眼织

B.左耳

C.左眼

D.右耳

E.右眼

52.处方中文缩写 OD 代表(E)

53.处方外文缩写 OU 代表(A)

54.处方中外文缩写 OS 代表(C)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

【55-57】

A.阿托品+碘解磷定

B.氟马西尼

C.硫代硫酸钠

D.乙酰半胱氨酸

E.纳洛酮

55.有机磷中毒的解救药物是(A)

56.地西洋中毒的解救药物是(B)

57.阿片类药物中毒的解救药物是(E)

【58-59】

A.长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素

B.吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

C.抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

D.吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药

E.吸入型糖皮质激素+祛痰药+镇咳药

58.慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是(C)

59.慢性阻塞性肺病稳定期患者(FEV1 < 50%)宜选用的治疗方案是(A)

【60-62】

A.复方磺胺甲噁唑



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B. 头孢克

C. 诺氟沙

D. 阿莫西林

E. 华法林

60. 老年人因血驶蛋白含量低用药后游物浓度可能明显增加的药物是(E)

61. 可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是(A)

62. 可能影响儿 J 童骨骼发育的药物是(C)

【63-65】

A. 2~3 个半衰期给药 1 次

B. 每日给药 1 次

C. 每个半衰期给懿次

D. 静脉滴注给

E. 每日给药 3 次

临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径

63. 半衰期大于 24h 的药物通常选择(B)

64. 半衰期小于 30min 且治疗指数低的药物通常选择(D)

65. 半衰期 12h 的药物通常选择(C)

【66-67】

A. 伏立康唑片



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.甲硝唑栓

C.莫匹罗星软膏

D.吲哚美辛栓

E.硝酸咪康唑坐栓

66.沿疗滴虫性阴道炎首选的药物是(B)

67.治治疗真菌性阴道炎首选的药物是(E)

【68-69】

A.西地碘含片

B.替硝唑含漱液

C.地塞米松粘贴片

D.氯己定含漱液

E.左旋咪唑片

68.频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是(C)

69.伴有甲状腺亢进症的口腔溃疡患者应避免使用的药物是(A)

【70-71】

A.依那普利

B.氢氯噻

C.美托洛尔

D.氨氯地平



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

E. 哌唑嗪

70. 高血压伴低钾血症患者慎用的药物是(B)

71. 高血压伴高钾血症患者慎用的药物是(A)

【72-74】

A. 数字评分法

B. CTP 评分标准

C. Cochrane 证据分级

D. APACH 评分系统

E. Beers 标准

72. 用于判断老年患者潜在不适当用药的是(E)

73. 用于评价肝功能不全严重程度的是(B)

74. 用于评估癌痛患者疼痛程度的是(A)

【75-77】

A. 氯苯那敏

B. 吲达帕胺

C. 胰霉

D. 阿司匹林

E. 阿托品

75. 服用后可致嗜睡, 驾驶员应慎用的药物是(A)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

76.服用后可引起多尿驾驶员应慎用的药物是(B)

77.服用后可致视物模糊驾驶员应慎用的药物是(E)

【78-79】

A.50%葡萄糖注射液

B.复方氯化钠注射液

C.0.9%氯化钠注射液

D.低分子右旋糖酐注射液

E.5%葡萄糖注射液

78.配制青霉素鹤碱的适宜溶媒是(C)

79.配制两性霉素 B 输液的适宜溶媒是(E)

【80-81】

A.硫酸镁

B.比沙可啶

C.双歧杆菌

D.干酵母

E.乳果糖

80.有较强刺激性服药时不可嚼碎的泻药是(B)

81.肝性脑病合并便秘患者首选的泻药是(E)

【82-83】



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

A.心力衰竭患者

B.痛风患者

C.胃溃疡患者 s9g

D.双侧肾动脉窄患者

E.哮喘患者

82.高血压治疗药物选择时,ACEI 类药物禁用于(D)

83.高血压治疗药物选择时噻类利尿剂慎用玉(B)

【84-86】

A.左氧氟沙星

B.乙胺丁醇

C.利幅平

D.吡嗪酰胺

E.链霉素

84.抗结核联合沿疗方案中,可引起球后视神经炎不良反应的药物是(B)

85.抗结核医合治疗方案中可出现橘红色尿的药物是(C)

86.抗错联合治疗方案中引起耳蜗神经损俯不良反应的药物是(E)

【87-88】

A.25.0

B.30.0



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

C.10.0

D.33.3

E.20.0

87.用 10%的氯化钠注射液和注射用水配制 3%的氯化钠注射液 100ml,所需的 10%氯化钠注射液的毫升数是(B)

88.5%葡萄糖注射液 500ml 含有葡萄糖的克数是(A)

【89-90】

A.双八面体蒙脱石

B.聚乙醇 4000

C.阿苯达唑

D.莫沙必利

E.多潘立酮

89.治疗肠道蛔虫病可选用(C)

90.治疗急性腹泻可选用(A)

三、综合分析选择题(共 20 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景病例、实例或案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。)

(一)

患者女,68 岁体重 54kg,因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院,如愿后升华检查 ALT20IU/L,,



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

血肌酐(Cr)1.8 mgdl 痰培养为铜绿假单胞菌临刺清头孢他啶。查疱他

啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5 ~ 6g,分 2 ~ 3 次给药肌酐清除率为 31~50ml/min 时

剂量为每 12 小时 1g;肌酐清除率为 16 ~ 30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g;肌酐清除率男

6~15ml/mn 时量为每 24 小时 0.5g;肌酐清除率≤5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

91.成年男性的肌酐清除率计算公式为 $C_{cr}=(140-\text{年龄})\text{体重}/(72\times Cr)$,成年女性的肌酐清

除率为男性的 0.85。该患者的肌酐清除率约是(A)

A.25.5ml/min

B.30ml/min

C.34ml/min

D.40ml/min

E.47.2ml /min

92.该患者头孢他啶的剂量应为(D)

A.每 8 小时 2g

B.每 12 小时 1g

C.每 24 小时 0.5g

D.每 24 小时 1g

E.每 48 小时 0.5g

(二)

患者女 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片 25 近日因反复胃痛成诊



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性医师处方埃索美拉唑镁肠溶片 20 mg bid,甲硝唑片 0.4gbid 克拉霉素片 50mg bd 枸橼酸铋钾胶囊 0.6gbig

93.该处方中给药剂量错误的药物是(B)

A.埃索美拉唑镁肠溶片

B.克拉霉素片

C.甲硝唑片

D.枸橼酸铋钾胶囊

E.美托洛尔片

94.该患者如长期服用埃索美拉唑镁肠溶片可能导致 (C)

A.维生素 A 缺乏

B.维生素 B2 缺乏

C.维生素 B12 缺乏

D.维生素 B6 缺乏

E.维生素 D 缺乏

(三)

患者易 52 岁,身高 168cm 体重 85kg,痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L(正常值:3.9 ~ 6.1mmol),餐后血糖 14.8mmol/L(正常值:<7.8mmol),尿酸 580umol(正常值:男性 180 ~ 440umol),血 LDLc3.7mmol/L(正常值:2.1~3.1mmol/L)肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

95.对该患者的治疗方案不推荐的是(B)

A.低嘌呤饮食

B.应用阿司匹林

C.适量运动

D.控制体重

E.应用他汀类药物

96 该患者首选胰岛素降糖药是(E)

A.格列齐特

B.阿卡波糖

C.甘精胰岛素

D.那格列

E.二甲双胍

97.该患者采用首选降糖药物后,经检测餐前血糖已达标餐后血糖仍控制不佳应考虑联合用的

降糖药是(D)

A.二甲双胍

B.格列齐特

C.阿卡波糖

D.甘精胰岛素



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

E.那格列奈

98.该患者联合用药后,常见的不良反应是(D)

A.心律失常

B.低血糖

C ALT 升高

D.腹胀

E.水钠潴留

(四)

患者,男 72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 ug bid 吸入沙平股醇气雾剂 100pgpm 吸入,氨氯地平片 5mgqd 口服及硝酸甘油片 0.5mgpm 舌下含服治疗。

99.药师在用药猎号时应告知患者布察德气雾剂正确的使用步骤是(C)

A.漱口→摇匀→呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约 1

B.呼气→摇匀→揿压阀门并深吸气→屏气约 10s→漱

C.摇匀呼气→深吸气同时撤压阀门→屏气约 0s-漱

D.呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约 10s→漱口

E.摇匀并揿压阀门→呼气→深吸气→屏气约 10s→漱口

100.该患者因近日在浇花时出现心哮和手指轻微震颤而就诊。体格检查:T36.8°C P120 次/min,R28 次/min,BP175/90mmhg。出现上述症状的可能原因是(B)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

A.布地奈德剂量太大

B.沙丁胺醇的不良反应

C.氨氨地平的不良反应

D.硝酸甘油剂量不足

E.布地奈德的不良反应

101.该患者血压控制不佳河考虑联合使用的抗离血压药是(A)

A.缬沙坦

B.非洛地平

C.普萘洛尔

D.维拉帕米

E.复方利血平

(五)

患者，女，54岁。诊断为类风湿关节炎2年，目前服用甲氨蝶呤(15mgqw)和塞来昔布(200mgqd)。患者因担心药品不良反应用约规律时断时续近具时腕关节肿胀和疼痛加重晨僵明显加用泼尼松 10mgqd。

102.关于该患者用药注意事项的说法错误的是(E)

A.应定期监测肝功能

B.泼尼松应于清晨服用

C.应定期监测血糖、血压



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.应定期监测骨密度

E.甲氨蝶呤应隔回次用药

103.关于该患者健康教育的说法,错误的是(D)

A.早期治疗、遵医嘱规律用药

B.多晒太阳适量补充钙剂、维生素 D 预防骨质疏松

C.定期随访评估病情,调整治疗案

D.一旦症状改善,应即刻停药

E.定期监测血常规、肝肾功能和粪隐血

(六)

患者女罗因发热体温 38.6℃ 头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查:白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

104.治疗该患者发热、头痛,首选的药物是(A)

A.对乙酰氨基酚

B.尼美舒和

C.美洛西康

D.双氯芬酸钠

E.氨基葡萄糖

105.治疗该患者咳嗽首选的药物是(E)

A.可待因



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

B.乙酰半胱氨酸

C.溴己新

D.右美沙芬

E.氨溴索

106.根据该患者目前情况不宜选用的药物是(A)

A.头孢克洛于温号渐

B.感冒清热冲剂

C.葡萄糖酸锌口服液

D.维生素 C 片

E.复方小儿退热栓

(七)

患者男,62 岁,既往有高血压病史和磺胺药过敏史。近 1 年内出现阵发性胸痛多发生于劳累及情绪激动时每次发作持续时间约约为 4~5min,休息 2~3min 后可自缓解。体格检查:T36.3°C,P85 次/mn,R16 次/min,BP150/80mmHg 辅助检查提示血常规、尿常规、

心肌酶谱谱柳莊常,总胆固醇 8mmoll、LDLC4.0mmo 优心电图检查提示生心律,胸导联 ST 段下移 T 波倒置初步诊断为稳定型心绞痛、高血压、高脂血症。临床治疗方案如下

107.本处方中,给药次数错误的药物是(E)

A.吲达帕胺缓释片 壘 s

B.富马酸比索洛片



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

C.瑞舒伐他汀钙片

D.阿司匹林肠溶片

E.单硝酸异山梨酯缓释片

108.本处方中给药剂量错误的药物是(C)

A.富马酸比索洛尔片

B.单硝酸异山梨酯缓释片

C.瑞舒伐他汀钙片

D.阿司匹林肠溶片

E.吲达帕胺缓释片

109.该患者应禁用的药物是(C)

A.富马酸比索洛尔片

B.单硝酸异山梨酯缓释片

C.吲达帕胺缓释片

D.瑞舒伐他汀钙片

E.阿司匹林肠溶片

110.该患者服药 20 天后自觉全身肌肉酸痛化验结果显示肌酸肌酶升高引起此不良反应的药物是(B)

A.富马酸比索洛尔片

B.瑞舒伐他汀



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C.单硝酸异山梨酯缓释片

D.阿司匹林肠溶片

E.吲哚洛尔缓释片

四、多项选择题(共 10 题，每题 1 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意。错选、少选不得分。)

111.可用于提高老年患者用药依从性的措施有(ABDE)

A.选择简化的用药方案

B.使用分时药盒

C.优先选用注射剂

D.进行用药指导

E.告知家属帮助督导

112.药源性疾病的治疗原则包括(ABCDE)

A.停用致病药物

B.加快致病药物

C.使用拮抗剂

D.调整治疗方案

E.对症治疗

113.下列物中易受光热影响的变质需要遮光保存的物有(ABDE)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

A.肾上腺素

B.维生素 K1

C.碳酸钡

D.维生素 B12

E.甲钴胺

114.用药后不能碰凉水的情形有()

A.高血压患者服用硝苯地平控释片

B.心绞痛发作患者舌下含服硝酸甘油片

C.口腔炎患者使用复方氯己定含漱液

D.中暑患者如用藿香正气软胶囊

E.发热患者使用阿司匹林泡腾片

115.药师应提供的药学服务内容包括(ACDE)

A.用药咨询

B.药保供西药

C.药品干预

D.药物重整

E.药物治疗管理

116.甲状腺功能亢进症的临床表现包括(BCDE)

A.声音嘶哑、毛发稀疏、眉毛外端 1/3 脱落



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.多食、消瘦、、躁激动等高代谢症候群

C.神经和血管釜性增强如心悸<手颤

D.不同程度的突眼和甲状腺肿大等特征性体征

E.少数老年患者可表现为乏力、体重明显减轻称为“淡漠型甲亢

117.氰化物中毒的解毒剂有(ABC)

A.亚硝酸钠

B.亚甲蓝

C.硫代硫酸钠

D.纳洛酮

E.巯丙醇

118.指合理用药告知患者服药后急冰的药物有(AE)

A.复方磺胺甲噁唑片

B.复方甘草片

C.硝酸甘油片

D.磷酸铝凝胶

E.阿昔洛韦片

119.《中华人民共和国药典临床用药须知(2010 年版)》中规定必须做皮肤敏感试验的药物有(AD)

A.青霉素钠



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.阿奇霉素 

C.阿莫西林

D.破伤风抗毒素

E.甲钴胺 

120.改善认知功能的治疗阿尔茨海默病的药物有(CE)

A.文拉法辛

B.阿米替林 

C.多奈哌齐

D.丙米嗪

E.卡巴拉浮 



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！