

2015 年执业药师真题及答案专题：<http://www.233.com/yaoshi/zhuanti/zhentidaan/>

名师真题考点解析（免费试听）：<http://wx.233.com/yaoshi/>

<http://wx.233.com/search/study/?mid=20123&did=170212&teacher=759>

## 2015 年执业药师《药专业知识二》真题及答案

### 药专业知识二（网友版）

一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 老年人对苯二氮草类药物较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟缓等症状，在临床上被称为 **C**

- A. 震颤麻痹综合征      B. 老年期痴呆      C. “宿醉”现象      D. 戒断综合征  
E. 锥体外系反应

2. 下列药品中，属于酰胺类的脑功能改善及抗记忆障碍要是 **A**

- A. 吡拉西坦      B. 胞磷胆碱      C. 利斯的明      D. 多奈哌齐      E. 石杉碱甲

3. 李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是 **C**

- A. 二甲双胍      B. 辛伐他汀      C. 米氮平      D. 阿司匹林      E. 硝酸甘油

4. 可以降低血尿酸水平，但升高尿酸水平而易导致肾结石的抗痛风药是 **C**

- A. 秋水仙碱      B. 别嘌醇      C. 丙磺舒      D. 吠塞米      E. 布洛芬

5. 在痛风发作的急性期，应当首选的抗痛风药是 **A**

- A. 秋水仙碱      B. 二氟尼柳      C. 苯溴马隆      D. 别嘌醇      E. 阿司匹林

6. 患者，女，45 岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是 **B**

- A. 硝苯地平      B. 双氯芬酸      C. 雷尼替丁      D. 格列齐特      E. 二甲双胍

7. 哮喘急性发作应用平喘药，最适宜的给药途径是 **A**

- A. 吸入给药      B. 口服给药      C. 静脉滴注      D. 肌肉注射      E. 透皮给药

8. 瑞伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是 **B**

- A. 左氧氟沙星      B. 羧甲司坦      C. 泼尼松龙      D. 多索茶碱      E. 右美沙芬



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

9. 需要嚼碎服用的药品是 **C**

A. 泮托拉唑肠溶片 B. 胰酶肠溶片 C. 乳酸菌素片 D. 胶体果胶铋胶囊 E. 法莫替丁片

10. 长期和较大剂量服用质子泵抑制剂后的潜在风险是 **D**

A. 动脉粥样硬化 B. 应激性大出血 C. 血小板减少症 D. 骨质疏松性骨折 E. 胃食管反流病

11. 不易导致便秘或腹泻不良反应的抗酸药是 **D**

A. 氢氧化铝 B. 三硅酸镁 C. 碳酸钙 D. 铝碳酸镁 E. 硫糖铝

12. 妊娠期高血压妇女宜选用的药品是 **E**

A. 福辛普利 B. 利血平 C. 厄贝沙坦 D. 阿利克伦 E. 甲基多巴

13. 具有肺毒性和光敏反应的抗心律失常药是 **E**

A. 普罗帕酮 B. 美西律 C. 地尔硫草 D. 维拉帕米 E. 胺碘酮

14. 用于低分子肝素过量时解救的药品是 **D**

A. 氨甲环酸 B. 酚磺乙胺 C. 维生素 K<sub>1</sub> D. 鱼精蛋白 E. 血凝酶

15. 给药后易产生抗体，5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降，1 年内不宜再次使用的溶栓药是 **D**

A. 阿替普酶 B. 瑞替普酶 C. 尿激酶 D. 链激酶 E. 降纤酶

16. 服用华法林初七，应当每日监测凝血指标，将国际标准化比值（INR）目标值控制在 **A**

A. 2.0~3.0 B. 3.0~4.0 C. 4.0~5.0 D. 5.0~6.0 E. 7.0~8.0

17. 属于凝血因子 Xa 直接抑制剂的抗凝药是 **D**

A. 依诺肝素 B. 肝素 C. 华法林 D. 利伐沙班 E. 达比加群酯

18. 长期使用可使血钾水平升高的药品是 **A**



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

- A. 氨苯蝶啶 B. 呋塞米 C. 吲达帕胺 D. 乙酰唑胺 E. 氢氯噻嗪
19. 属于糖皮质激素禁忌症的是 **A**  
A. 严重高血压 B. 过敏性皮炎 C. 再生障碍性贫血  
D. 类风湿性关节炎 E. 血管神经性水肿
20. 服用时必须保持坐位或立位、空腹、服后 30 分钟内不宜进食和卧床的药品是 **D**  
A. 依降钙素 B. 依普黄酮 C. 雷洛昔芬 D. 阿伦磷酸钠 E. 阿法骨化醇
21. 维持心肌和神经肌肉的正常应激性，须静脉滴注给药的电解质是 **D**  
A. 氯化钙 B. 氯化钠 C. 硫酸镁 D. 氯化钾 E. 氯化铵
22. 二磷酸果糖注射液禁用的人群是 **D**  
A. 高镁血症者 B. 高钾血症者 C. 高尿酸血症者 D. 高磷血症者 E. 高钙血症者
23. 可导致跟腱炎或跟腱断裂不良反应的药品是 **E**  
克林霉素 B. 美罗培南 C. 阿米卡星 D. 头孢哌酮 E. 环丙沙星
24. 静脉滴注速度过快可能发生“红人综合征”的药品是 **C**  
A. 夫西地酸 B. 磷霉素 C. 万古霉素 D. 莫西沙星 E. 氯霉素
25. 长期大量应用头孢菌素类抗菌药物的患者，须注意适当补充 **B**  
A. 维生素 A 和维生素 D B. 维生素 B 和维生素 K  
C. 维生素 C 和烟酸 D. 维生素 E 和叶酸  
E. 维生素 B<sub>12</sub> 和叶酸
26. 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是 **C**  
A. 拉米夫定 B. 恩替卡韦 C. 泛昔洛韦 D. 干扰素 E. 阿德福韦酯
27. 属于神经氨酸酶抑制剂的抗流感病毒药是 **E**  
A. 拉米夫定 B. 更昔洛韦 C. 利巴韦林 D. 阿德福韦酯 E. 奥司他韦
28. 我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗癌药是 **B**  
A. 奎宁 B. 青蒿素 C. 氯喹 D. 伯氯喹 E. 乙胺嘧啶
29. 通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是 **C**  
A. 青蒿素 B. 氯喹 C. 哌嗪 D. 噻嘧啶 E. 吡喹酮



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

30. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是 **A**  
A. 表皮生长因子受体 B. 血管内皮生长因子 C. B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原  
D. 人表皮生长因子受体-2 E. 雌激素受体
31. 为预防甲氨蝶呤所致的肾毒性，在化疗期间，除大量水化和利尿外，还应同时给予的尿路保护剂是 **C**  
A. 呋塞米 B. 氯噻酮 C. 美司钠 D. 坦洛新 E. 亚叶酸钙
32. 具有心脏毒性的抗肿瘤药是 **A**  
A. 柔红霉素 B. 长春新碱 C. 紫杉醇 D. 博来霉素 E. 环磷酰胺
33. 干扰肿瘤细胞转录过程和阻止 RNA 合成的抗肿瘤药是 **A**  
A. 多柔比星 B. 氟尿嘧啶 C. 伊立替康 D. 多西他赛 E. 门冬酰胺酶
34. 治疗单纯疱疹性角膜炎不宜选用的药品是 **D**  
A. 利巴韦林滴眼液 B. 更昔洛韦滴眼液 C. 碘苷滴眼液  
D. 四环素可的松眼膏 E. 阿昔洛韦滴眼液
35. 运动员慎用的外用药是 **A**  
A. 1%麻黄碱滴鼻液 B. 3%过氧化氢滴耳液 C. 2%芬甘油滴耳液



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

D. 0.1%阿昔洛韦滴眼液 E. 0.1%利福平滴眼液

36. 对消毒防腐药苯酚耐药的病原微生物是 **E**

A. 球菌 B. 双球菌 C. 杆菌 D. 真菌 E. 病毒

37. 属于超强效的外用糖皮质激素是 **C**

A. 氢化可的松 B. 地塞米松 C. 卤米松 D. 曲安奈德 E. 氟轻松

38. 大剂量使用，透皮吸收后对神经系统产生毒性，有诱发癫痫危险的药品是 **B**

A. 维 A 酸软膏 B. 克罗米通乳膏 C. 硫黄软膏 D. 酮康唑乳膏 E. 林旦乳膏

39. 可抑制鲨烯环氧酶的活性，属于丙烯胺类抗皮肤真菌药的是 **C**

A. 制霉菌素 B. 联苯苄唑 C. 特比萘芬 D. 阿莫罗芬 E. 环吡酮胺

40. 可用于重度痤疮（尤其是结节囊肿型痤疮）的药品是 **D**

A. 过氧苯甲酰 B. 克林霉素 C. 阿达帕林 D. 异维 A 酸 E. 克罗米通

二、配伍选择题（共 60 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用。也可不选用。每题只有 1 个选项最符合题意）

【41-42】

A. 胆绞痛 B. 低血压

C. 便秘 D. 躁狂

E. 多汗

41. 阿片类镇痛药与阿托品合用，可抑制胃肠蠕动，导致的不良反应是 **C**

42. 阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致不良反应是 **B**

【43-45】

A. 阿米替林 B. 氟西汀

C. 吗氯贝胺 D. 文拉法辛

E. 米氮平

43. 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是 **B**

44. 属于 A 型单胺氧化酶抑制剂的是 **C**

45. 属于 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂的是 **D**



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

【46-47】

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 沙美特罗 | B. 孟鲁司特 |
| C. 多索茶碱 | D. 布地奈德 |
| E. 噻托溴铵 |         |

46. 属于磷酸二酯酶抑制剂的平喘药是 **C**

47. 属于白三烯受体阻断剂的平喘药是 **B**

【48-49】

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 多索茶碱 | B. 孟鲁司特 |
| C. 沙美特罗 | D. 噻托溴铵 |
| E. 沙丁胺醇 |         |

48. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效  $\beta_2$  受体激动剂是 **C**

49. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是 **D**

【50-52】

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 法莫替丁 | B. 多潘立酮 |
| C. 氯苯那敏 | D. 奥美拉唑 |



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

E. 莫沙必利

50. 属于多巴胺 D<sub>2</sub> 受体阻断剂的是 **B**

51. 属于选择性 5-HT<sub>1</sub> 受体激动剂的是 **B**

52. 属于组胺 H<sub>2</sub> 受体阻断剂的是 **A**

【53-55】

A. 甘油（开塞露）

B. 聚乙二醇 4000

C. 乳果糖

D. 酚酞

E. 硫酸镁

53. 属于刺激性泻药的是 **D**

54. 属于润滑性泻药的是 **A**

55. 属于膨胀性泻药的是 **B**

【56-58】

A. 每次 1mg

B. 每次 2.5mg

C. 每次 4mg

D. 每次 5mg

E. 每次 12.5mg

56. 氨氯地平用于高血压的初始计量是 **D**

57. 拉西地平用于高血压的初始计量是 **C**

58. 卡托普利用于高血压的初始计量是 **B**

【59-60】

A. 硝酸甘油

B. 利多卡因

C. 氨氯地平

D. 氯沙坦

E. 美托洛尔

59. 可阻断 β 受体，用于治疗房性及室性心律失常的药品是 **B**

60. 可阻滞钠通道，用于治疗室性心律失常的药品是 **B**



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

【61-63】

- |          |         |
|----------|---------|
| A. 维拉帕米  | B. 胺碘酮  |
| C. 美西律   | D. 拉贝洛尔 |
| E. 普鲁卡因胺 |         |

61. 属于钠通道阻滞剂（第 I a 类）的抗心律失常药是 **E**

62. 属于延长动作电位时程药（第 III 类）的抗心律失常药是 **B**

63. 属于钙通道阻滞剂（第 IV 类）的抗心律失常药是 **A**

【64-65】

- |         |         |
|---------|---------|
| A. 阿司匹林 | B. 氯吡格雷 |
| C. 替罗非班 | D. 奥扎格雷 |
| E. 前列环素 |         |

64. 属于二磷酸腺苷 P2Y<sub>12</sub> 受体阻断剂的是 **B**

65. 属于血小板膜蛋白 II b/IIIa 受体阻断剂的是 **C**

【66-67】

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| A. 酚磺乙胺               | B. 氨甲环酸 |
| C. 血凝酶                | D. 卡巴克络 |
| E. 维生素 K <sub>1</sub> |         |

66. 属于促凝血因子合成药的是 **B**



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！



67. 属于促凝血因子活性药的是 **A**

【68-69】

- A. 呋塞米                      B. 螺内酯  
C. 乙酰唑胺                    D. 氢氯噻嗪  
E. 甘露醇

68. 利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可用于慢性心力衰竭治疗的利尿剂是 **B**

69. 利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是 **C**

【70-71】

- A 他达拉非                      B 甲睾酮  
C 西地那非                      D 丙酸睾酮  
E 非那雄胺

70. 血浆半衰期较短的治疗阴茎勃起功能障碍的 5 型磷酸二酯酶抑制剂是 **C**

71. 血浆半衰期较长的治疗阴茎勃起功能障碍的 5 型磷酸二酯酶抑制剂是 **A**

【72-73】

- A. 卡比马唑片                      B. 复方碘口服液  
C. 甲硫咪唑片                      D. 甲状腺片  
E. 丙硫氧嘧啶片

72. 可引起胰岛素自身免疫综合征的抗甲状腺药是 **C**

73. 可引起中性粒细胞胞浆抗体相关性血管炎的抗甲状腺药是 **B**

【74-76】

- A. 阿卡波糖                      B. 二甲双胍  
C. 罗格列酮                      D. 西格列汀  
E. 格列吡嗪

74. 属于二肽基肽酶-4 抑制剂的是 **D**

75. 属于  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂的是 **A**

76. 属于胰岛素增敏剂的是 **C**

【77-79】

- A. 瑞格列奈                      B. 格列美脲  
C. 二甲双胍                      D. 普萘洛尔  
E. 格列喹酮

77. 2 型糖尿病伴轻、中度肾功能不全者适宜选用的降糖药是 **E**

78. 降糖作用迅速，被称为“餐时血糖调节剂”的降糖药是 **A**

79. 单纯饮食控制及体育锻炼无效的 2 型糖尿病肥胖患者首先的降糖药是 **C**



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

(80-81)

A. 维生素 B2      B. 维生素 B5      C. 维生素 E      D. 烟酸      E. 维生素 A

80. 防止夜盲症的维生素是：E

### 药学专业知识二（网友版）

81. 辅助治疗不孕症的维生素是：C

(82-83)

A. 果糖      B. 氯化钾      C. 氯化钙      D. 硫酸镁      E. 葡萄糖

82. 使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是：C

83. 使用螺内酯的心力衰竭患者，不宜选用的药品是：B



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

(84-85)

- A. 庆大霉素 B. 加替沙星 C. 多西环素 D. 头孢哌酮 E. 阿莫西林

84. 易导致血糖异常的药品是：B

85. 易导致牙齿黄染的药品是：C

(86-88)

- A. 林可霉素类 B. 酰胺醇类（氯霉素） C. 四环素类 D. 氨基糖苷类 E. 氟喹诺酮类

86. 可导致软骨关节病损、跟腱炎症，18 岁以下儿童禁用的抗菌药物是：E

87. 可抑制骨髓造血功能，或引起“灰婴综合征”，新生儿禁用的抗菌药物是：B

88. 可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期妇女和新生儿禁用的抗菌药物是：D

(89-91)

- A. 伏立康唑 B. 氟胞嘧啶 C. 氟康唑 D. 灰黄霉素 E. 特比萘芬

89. 治疗侵袭性念珠菌病首选：C

90. 治疗侵袭性曲霉病首选：A

91. 治疗皮肤浅表性癣菌病首选：E

(92-94)

- A. 两性霉素 B B. 卡泊芬净 C. 氟胞嘧啶 D. 阿糖胞苷 E. 酮康唑

92. 肝毒性大，对肝药酶影响大，药物相互作用多的抗真菌药是：E

93. 制成脂质体以降低药物肾毒性的抗真菌药是：A

94. 与其他抗真菌药无交叉耐药性的棘白霉素类抗真菌药是：B



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

【95-97】

A. 炔雌醇 B. 他莫昔芬 C. 阿那曲唑 D. 丙酸睾酮 E. 氟他胺

95. 属于雌激素受体拮抗剂的抗肿瘤药是 B

96. 属于抗雄激素类的抗肿瘤药是 E

97. 属于芳香氨酶抑制剂的抗肿瘤药是 C

【98-100】

药专业知识二（网友版）

A. 左氧氟沙星滴眼液 B. 复方托吡卡胺滴眼液 C. 毛果芸香碱滴眼液 D. 碘苷滴眼液 E. 阿昔洛韦滴眼液

98. 散瞳和调节睫状肌麻痹宜选用 B

99. 治疗青光眼宜选用 C

100. 治疗细菌性结膜炎宜选用 A

【107-110】

患者，女，70岁。拟行膝关节置换术，无磺胺类药物过敏史，皮试结果呈阴性。体征和实验室检查：低热，无感染，空腹血糖 4.6mmol/L，血常规白细胞计数  $6.0 \times 10^9/L$ 。手术医师处方抗菌药物预防感染。

107. 首选的抗菌药物是 B

A. 阿奇霉素 B. 头孢唑林 C. 万古霉素 D. 克林霉素 E. 磺胺嘧啶

108. 围术期预防性用药宜采用的给药途径是 C

A. 口服 B. 肌内注射 C. 静脉滴注 D. 皮下注射 E. 动脉注射

109. 围术期预防性用药的起始给药时机是 B

A. 术前 24 小时 B. 术前 0.5-2 小时 C. 术中 D. 术后 0.5-2 小时 E. 术后 24 小时



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

233网校 233网校  
www.233.com 药 学 专 业 知 识 二 ( 网 友 版 ) www.233.com

110. I 类清洁手术切口预防性应用抗菌药物的比例不得超出手术病例总数的 E

- A. 70% B. 60% C. 50% D. 40% E. 30%

四、多项选择题（共 10 题，每题 1 分，每题的备选项中，有 2 个或 3 个以上符合题意，错选、少选均不得分）

111. 服用非甾体抗炎药所致胃粘膜溃疡或出血的机制有 **ABDE**

- A. 抑制前列腺素合成，使胃黏膜失去保护作用  
B. 破坏胃黏膜保护屏障，直接损伤胃黏膜  
C. 促进胃内容物和胃酸反流进入食管中  
D. 抑制肝脏凝血酶原和凝血 X 因子合成途径  
E. 减少内皮细胞增生，减少溃疡床血管形成

112. 促胃肠动力药在应用中可致的典型不良反应有 AC

- A. 高泌乳素血症 B. 类磺胺药过敏反应 C. 锥体外系反应 D. 5-羟色胺综合征

113. 患者，男，59 岁，诊断为急性心绞痛，医生处方硝酸甘油片，舌下含服，药师应交代的注意事项包括 **ABCE**

- A. 服药时尽量采取坐、卧位  
B. 口腔粘膜干燥者先用水润湿口腔后再含服  
C. 服药后可能出现头痛、面部潮红  
D. 咳嗽是典型的不良反应  
E. 15 分钟内重复给药 3 次，症状仍不能缓解，应及时就医

114. 临床常用的促凝血药的类别包括 ABD

- A. 促凝血因子合成药 B. 促凝血因子活性药 C. 促纤维蛋白溶解药 D. 影响血管通透性药 E. 血管紧张素转换酶抑制剂



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

115. 与其他抗凝药相比，凝血因子 Xa 直接抑制剂具有的药理作用特点包括 **ABCDE**  
A. 作用直接、选择性高 B. 血浆半衰期较长 C. 治疗窗宽，无需监测 INR D. 肾功能不全者使用后出血风险低 E. 抗凝作用强且不影响已形成的凝血酶活性

116. 糖皮质激素的禁忌症包括 **ABCD**

A. 活动性消化性溃疡 B. 严重精神病或癫痫 C. 严重 2 型糖尿病  
D. 未能控制的细菌、病毒或真菌感染 E. 系统性红斑狼疮

117. 在电解质紊乱（低血钾、低血镁）下服用，易引发尖端扭转型室性心律失常的药品有 **ABCD**

A. 阿司咪唑 B. 利培酮 C. 西沙必利 D. 奎尼丁 E. 双嘧达莫

118. 可以抑制细菌核糖体 50s 亚单位，阻碍细菌蛋白质合成的抗菌药物有 **ABD**

A. 林可霉素类 B. 大环内酯类 C. 头孢菌素类 D. 酰胺醇类（氯霉素） E. 氨基糖苷类

119. 可引起“双硫仑样”反应，服药期间禁止饮酒的抗菌药物有 **ABE**

A. 头孢哌酮 B. 甲硝唑 C. 呋喃妥因 D. 磷霉素 E. 头孢他啶

120. 对重度致吐化疗药所引起的恶心、呕吐，可选择的治疗药品有 **ABC**

A. 昂丹司琼 B. 地塞米松 C. 阿瑞吡坦 D. 多西他赛 E. 托瑞米芬



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！