

添加学霸君微信号“ks233wx7”，拉你进 2020 年执业药师药师备考交流群。

通过 233 网校 APP—我的资料包，下载更多执业药师学习资料，最新章节习题，模拟试题，历年真题在线免费做!

[点击注册 >> 领取执业药师礼包\(购课优惠券+精讲班免费视频+精华资料\)>>](#)

2020 年执业药师《药学专业知识二》新增考点解析：

抗肥胖症药

超重即体重超过了“正常”范围，由于肥胖会显著增加死亡和许多健康风险，包括 2 型糖尿病、高血压、血脂异常和冠状动脉性心脏病等，肥胖者应减重。

肥胖症治疗目标是预防、治疗或逆转肥胖的并发症，并提高生活质量。对于可能获益于体重减轻者，初始治疗宜采取生活方式综合干预，包括膳食、锻炼和行为改变。只有通过综合生活方式干预未达到减重目标(3~6 个月减去至少 5%的总体重)时才考虑药物治疗。

目前国内获准用于治疗肥胖的药物是奥利司他，奥利司他是目前首选的口服减肥药。

一、新增内容

药理作用与作用	奥利司他是长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂，通过与酶结合使酶失活而发挥治疗作用
机制	失活的酶不能将食物中的脂肪（三酰甘油）水解，使未消化的三酰甘油不被身体吸收，从而减少热量摄入
作用特点	奥利司他的吸收量极微，口服后 8h 测不出完整的奥利司他血浆浓度 奥利司他的代谢主要集中在胃肠道壁，未吸收的药物主要通过粪便排出体外
相互作用	可使脂溶性维生素的吸收减少，如正在服用含有维生素 A、D 和 E 的制剂，应在服用本品 2h 后或在睡前服用 2 型糖尿病患者可能需减少口服降糖药(如磺酰脲类药物)的剂量



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

	与环孢素联合用药时可造成环孢素血浆浓度降低
	与胺碘酮合用时, 可能导致胺碘酮吸收减少而降低疗效
	联合服用奥利司他和抗凝血药时, 会产生凝血酶减少, INR 增加
不良反应	主要引起胃肠道不良反应, 急性反应有腹痛、腹部不适、胃肠胀气、水样便、软便、直肠痛/直肠部不适、牙齿不适、牙龈不适
	常见油性斑点、胃肠排气增多、大便紧急感、脂肪性大便、脂肪泻、大便次数增多和大便失禁
	少见呼吸道感染、头痛、月经失调、焦虑、疲劳、泌尿道感染、过敏
	对药物制剂中任何一种成分过敏的患者、慢性吸收不良综合征、胆汁淤积患者, 器质性肥胖患者(如甲状腺功能减退) 禁用
奥利司他	适用于肥胖和体重超重者, 包括那些已经出现与肥胖相关的危险因素的患者长期治疗
	成人餐时或餐后 1h 内服胶囊 1 粒, 未进或食物中不含脂肪, 可省略一次服药
	妊娠期妇女、哺乳期妇女禁用; 服用本品时尽量减少摄入脂肪含量高的食物

二、考情分析

本小节新增内容为次要内容, 考查几率不大, 因此考生复习时以了解为主, 或者时间不充裕可跳过该小节。

执业药师刷题: 每日一练、章节练习、模拟考场、历年真题在线题库, 配备老师视频解析掌上刷, 另有做题记录、错题集、收藏试题、积分下载试题离线刷, 以及个性化做题习惯设置, 移动学习更方便! 更有答题闯关, 知识点打卡、模考大赛等活动边刷题边赢奖品! 伴你备考路上丰富多彩!

手机应用市场搜索“233 网校”或识别下图二维码, 点击下载 233 网校 APP



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握